



Patienteninformation

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

es wurde ein chirurgischer Eingriff bei Ihnen durchgeführt. Bitte beachten Sie daher Folgendes:

Einen evtl. eingebrachten **Tupfer** können Sie ca. 30 Minuten nach dem Eingriff vorsichtig entnehmen und entsorgen.

Um Bissverletzungen vorzubeugen, bitten wir Sie, erst wieder zu **Essen**, wenn die Spritze nicht mehr wirkt und Sie wieder volles Gefühl in Lippe und Zunge verspüren. Weiterhin bitten wir Sie am Operationstag auf **koffeinhaltige Getränke** und **Alkohol** gänzlich zu verzichten.

Um eine stadiengerechte Wundheilung zu gewährleisten, sollten Sie nach dem operativen Eingriff **nicht Rauchen**.

Bitte **spülen** Sie den Mund nicht **aus**, um das sich bildende Blutgerinnsel im Operationsgebiet nicht zu verletzen, welches zur Wundheilung notwendig ist.

Sollte es zu einer **Nachblutung** kommen, z.B. wenn die örtliche Betäubung ihre Wirkung verliert, beißen Sie bitte fest eine halbe Stunde auf den Ihnen mitgegebenen Tupfer bzw. auf ein sauberes Stofftaschentuch.

Eine leichte **Schwellung** nach einer Operation kann normal sein. Diese ist meist am dritten Tag nach dem Eingriff oder morgens nach dem Aufwachen am deutlichsten. Bitte **Kühlen** sie das Operationsgebiet von außen mit feuchten Umschlägen.

Schmerzen nach einem operativen Eingriff sind normal. Bitte Nehmen Sie die von uns rezeptierten Schmerzmittel wie verordnet ein.

Besonders nach der Entfernung von Weisheitszähnen kann es in den ersten Tagen nach der Operation zu einer **Einschränkung der Mundöffnung** bzw. zu **Schluckbeschwerden** kommen.

Nach einem operativen Eingriff im Oberkiefer Seitenzahnggebiet kann in einzelnen Fällen eine leichte **Blutung** aus der **Nase** auftreten. Bitte Schnetzen Sie sich nicht fest, sondern tupfen die Nase leicht ab.

Bitte steuern Sie nach der Operation kein **Fahrzeug** selber, da nach der örtlichen Betäubung Ihre Reaktionsfähigkeit eingeschränkt sein kann.

Weiterhin bitten wir Sie, Ihre **häusliche Mundhygiene** wie gewohnt fortzuführen. Sparen Sie hierbei die Näfte aus und benutzen Sie zusätzliche eine chlorhexidinhaltige Mundspüllösung.

Bitte kontaktieren Sie uns bei anhaltenden Schmerzen, einer starken Schwellung, einer anhaltenden Nachblutung oder bei einer Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung,

Ihr Praxisteam in der Filzfabrik!